

我需要打疫苗嗎？

- **心血管疾病** 患者 **強烈建議施打** (如 **心肌梗塞**、狹心症、心衰竭、**心房顫動**、先天性心臟病、心肌症、肺栓塞、裝設心血管支架等患者)
- **高血壓** 與 心律不整 並 **非** 疫苗施打之禁忌症，建議施打
- 美國或歐洲心臟醫學會皆建議施打

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**，目前無明確報告顯示心臟用藥與疫苗有交互作用
- 服用 **抗血小板藥物** 或抗凝血劑皆 **可** 施打，唯須注意接種傷口是否產生血腫，
- 建議接種處 **加壓** 久一些

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
包含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

我需要打疫苗嗎？

- **建議施打**
- 所有 **心臟疾病** (如心肌梗塞/心臟衰竭/先天性心臟病/裝設心血管支架/心臟瓣膜疾病等), 或有罹患 **心血管** 疾病 **高風險** 者(如高血壓/吸菸/糖尿病/高血脂/肥胖), 皆建議施打
- **周邊血管疾病** (如 **靜脈曲張** / 周邊動脈阻塞 / 深層靜脈栓篩) 患者, 非COVID-19疫苗之禁忌症, 且感染COVID-19後 **血栓** 風險高, 建議施打

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**
- 施打 **時間點** 與施打前是否須 **抽血** 檢查 **凝血功能** (服用抗凝血劑 **Warfarin**), 請與 **醫師討論**
- 因心血管疾病/ **心臟手術** / **心臟移植** 前後, 使用 **抗血小板/抗凝血劑/免疫抑制劑** 者, 均 **可** 施打疫苗
- 使用凝血功能相關藥物者, 請於施打處確實 **加壓10分鐘** 以上, 避免瘀血產生

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
含：AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT/嬌生

風濕免疫科

吳俊欣 成大風濕免疫科主治醫師

我需要打疫苗嗎？

- **強烈建議施打**，自體免疫病患者感染COVID-19後 **重症** 風險較高，應優先施打
- **國際** 各大風濕病醫學會一致認為：**無論何種** 風濕病患者，皆可施打疫苗

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- 病情控制穩定之患者，經醫師評估後皆可施打
- 部份 **免疫調節劑** (含生物製劑/小分子標靶藥物)，於疫苗施打前後須做調整
- 風濕免疫疾病之藥物與免疫系統相關，種類繁多且複雜，請與醫師討論，以規畫適當的 **接種時間點**
- **中華民國風濕病醫學會** 有較完整的藥物參考資料，建議可上網查詢



我該選擇哪一種疫苗？

- 因免疫力風險，**不建議** 接種 **活性減毒疫苗**
- 國際認可的 **腺病毒** 或 **mRNA** 疫苗 **都是適合的疫苗**
含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT/嬌生**
- 腺病毒疫苗(如AZ/嬌生)引發 **血栓(VITT)** 機會極低，遠低於 **風濕病本身血栓** 風險，且血栓 **機轉** 與一般血栓不同，目前僅有 **肝素引發血小板低下** 病史患者須特別注意

腎臟科

吳培甄 腎臟內科專科醫師/教育部定助理教授
吳志仁 腎臟內科專科醫師/教育部定教授

我需要打疫苗嗎？

- **強烈建議施打**
- **慢性腎臟病** 感染後 **重症風險高**，腎功能越差風險越高
- **洗腎患者** 免疫力差，常患多重疾病，洗腎時難免 **群聚**，**感染風險** 與 **死亡率** 皆較高

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**，使用 **免疫調節劑者** (如接受 **腎臟移植**、腎絲球腎炎患者) 請與 **主治醫師討論**
- **洗腎** 時如有使用 **抗凝血劑**，接種後注射處 **加壓** 2分鐘以上，避免注射處出血或血腫

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
包含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

我需要打疫苗嗎？

- 慢性阻塞性肺病(COPD) 與 肺纖維化 患者 **強烈建議施打**，因感染後重症風險高
- 氣喘、長期使用 **呼吸器** 或使用呼吸器超過21天患者，亦 **建議施打**

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**，大多藥物並無證據顯示與疫苗有交互作用，包含氣喘患者使用之 吸入型藥劑 (含 **吸入型類固醇**)，請持續依所需劑量使用
- 氣喘患者使用之 **生物製劑**，建議疫苗接種 **後一週** 再開始使用
- **生物製劑** 如：喜瑞樂(Xolair)/舒肺樂(Nucala)/杜避炎(Dupixent)/肺昇朗(Fasenra)

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
包含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

我需要打疫苗嗎？

- 歐洲及美國肝病學會皆 **強烈建議** 慢性肝病患者(含 **慢性B肝/C肝**、**自體免疫肝炎**、**脂肪性肝炎**)施打COVID-19疫苗
- **肝癌** 患者亦建議施打
- 等待 **肝臟移植** 的慢性肝病患者，建議於 **移植前** 施打，以確保適當的免疫反應
若肝功能極度 **不穩定**，務必 **先與主治醫師討論**

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**，接受 **抗病毒藥物** 之 **B肝/C肝** 患者，無須中斷藥物
- 接受局部 (**電燒/栓塞**) 或全身性治療 (**化療**) 的 **肝癌** 患者，無須中斷治療
- 接受 **免疫抑制藥物** (如肝臟移植)，請與醫師討論 **接種時間點**

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

我需要打疫苗嗎？

- **建議施打**，以降低感染及重症風險
- 糖尿病 **本身** 即為新冠肺炎 **重症** 的 **危險因子**

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**，包含各種 **口服藥物** 及 **胰島素針劑**
- 建議在身體狀況 **穩定下** 接種疫苗，若仍在不穩定狀態(如 **高血糖危急症**、**嚴重低血糖**)，請務必與醫師討論

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**
- **中華民國糖尿病學會** 與 **中華民國糖尿病衛教學會** 一致認同：**有疫苗即是好疫苗**

我需要打疫苗嗎？

- **建議施打**，以降低感染，與更重要的重症發生率
- 高血脂包含 **高膽固醇** 與 **高三酸甘油脂**

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**，含 **降膽固醇藥**、**降三酸甘油脂** 藥物
- 若身體狀況尚不穩定，請務必與主治醫師討論

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

我需要打疫苗嗎？

- **建議施打**，以降低感染，與更重要的重症發生率
- 甲狀腺疾病，包含 **自體免疫甲狀腺疾病** (如葛瑞夫茲氏病、橋本式甲狀腺炎)，及各種 **甲狀腺腫瘤**
- 自體免疫甲狀腺疾病，即因免疫失調，造成甲狀腺功能 **亢進** 或 **低下** 等問題

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**，含 **抗甲狀腺** 藥物(甲狀腺亢進使用)、**甲狀腺素補充** (甲狀腺低下或術後低下)
- 建議於身體狀況穩定下(如甲狀腺指數相對平穩期)，接種疫苗
- 若甲狀腺指數仍不穩定，請務必與主治醫師討論

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

感染科(HIV)

李欣純 感染科專科醫師
顧文璋 台北市仁愛醫院感染科主任

我需要打疫苗嗎？

- **建議施打**
- 雖仍 **未有定論**，但部分研究顯示HIV感染有 **可能** 增加COVID-19感染及重症風險
- HIV感染者常見之 **共病**，如糖尿病/心血管疾病等，為嚴重COVID-19之相關因子

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**
- **抗HIV** 病毒藥物並 **不** 會與目前國內核可之疫苗產生交互作用
- 若同時合併其他 **嚴重感染症** 或其他疾病，於 **急性期** 或病情 **未穩定** 之前，建議 **暫緩** 施打疫苗，請與醫師討論 **未來接種** 時機

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的 **腺病毒** 或 **mRNA** 疫苗 **都是適合的疫苗**
含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**
- 除非您對COVID-19疫苗 **成分嚴重過敏** 而有禁忌，否則目前HIV感染者接種COVID-19疫苗並無額外的安全顧慮

我需要打疫苗嗎？

- 建議施打
- 癌症 **非** COVID-19疫苗之禁忌症，且若感染，有較嚴重之併發症
- 無論 **正接受治療**，或 **治癒之** 癌症病友，皆建議施打疫苗

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- 正接受 **固定週期化療** 或 **免疫治療** 患者，考量治療與疫苗可能同時造成身體不適，建議與主治醫師討論疫苗 **接種時間點** 與相對必要性
- 接受 **標靶治療** (如蕾莎瓦Nexavar)、**賀爾蒙治療** (如泰莫西芬Tamoxifen)、**口服化療藥物** (如溫諾平)患者，原則上 **隨時可** 接受施打，但仍建議與主治醫師討論 **接種時間點**

我該選擇哪一種疫苗？

- 因疾病(如 **白血病**)或 **化療** 導致免疫功能低下，皆 **不建議** 接種 **活性減毒疫苗**
- 國際認可的 **腺病毒** 或 **mRNA** 疫苗 **都是適合的疫苗**，
含：AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT/嬌生

我需要打疫苗嗎？

- **建議施打**，因免疫力及血液功能問題，感染風險與死亡率較高
- 常見的缺鐵性 **貧血**、地中海型 **貧血**或較少見的 **血友病** 等，皆 **建議施打**
- 特殊疾病接受 **幹細胞移植** 或 **化療** 病人，請與主治醫師 **討論接種時間點**

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- 正接受 **化療** 病人，因治療藥物種類複雜，請務必與 **主治醫師** 討論
- **化療** 會影響病人血球與免疫力，需與醫師討論 **接種時間點**，以利疫苗發揮效果
- 接受異體造血 **幹細胞移植** 病人，請於移植三個月後再考慮接種
- 為讓疫苗產生抗體，通常會 **延後** 下一次化療，請務必 **告知醫師** 以安排療程

我該選擇哪一種疫苗？

- 因疾病(如 **白血病**)或化療導致免疫功能低下，皆 **不建議** 接種 活性減毒疫苗
- 國際認可的 **腺病毒** 或 **mRNA** 疫苗 **都是適合的疫苗**
含：AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT/嬌生

我需要打疫苗嗎？

- **強烈建議**
- 癌症患者若感染COVID-19，**重症率** 與 **死亡率** 皆較一般人高

我正接受放射治療可以打疫苗嗎？

- **可以**
- 疫苗不會影響放射治療效果，放射治療也不會增加疫苗副作用
- 目前無報告顯示放射治療會影響疫苗效力
- 接受放射治療的 **任何時間點** 皆可接受疫苗施打，建議勿因此延遲或中斷療程

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
含：AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生

神經科(中風)

謝函潔 神經科專科醫師

陳志弘 神經科專科醫師/成大醫院中風中心召集人

我需要打疫苗嗎？

- **需要！** 腦中風患者大多年紀偏高，有多重疾病，感染及進展為重症的風險大
- 腦中風的血管栓塞原因與疫苗產生血栓的 **機轉不同**，不影響血栓風險
- 有 **腦靜脈栓塞病史** 或 特殊原因導致中風的患者(如 **特殊免疫 / 血液** 相關疾病)，請先 **與醫師討論**

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**，接種後注射處 **加壓5~10分鐘**，**避免血腫**，**觀察2天** 是否有血腫產生/擴大
- 服用 **抗血小板藥物** (如 **阿斯匹靈、保栓通**)，不需調整，也不需停用藥物
- 服用 **新型抗凝血劑** (如 **普栓達、拜瑞妥、愛必克凝、里先安**)，不需調整，也不需停
- 服用 **抗凝血劑 Warfarin** 患者，請與醫師討論，是否需抽血檢查凝血功能

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**，
包含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

我需要打疫苗嗎？

- **需要！**
- 一般癲癇並 **不會** 因施打疫苗而增加發作或惡化
- 對 **體溫敏感** 的癲癇 / 曾因 **發燒伴隨癲癇發作** 患者，建議接種後服用 **普拿疼** 等 **退燒藥** 接種 **第一劑** 後曾有癲癇發作，接種第二劑前，**請與主治醫師討論**

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**
- 目前無研究報告顯示癲癇藥物與疫苗施打有衝突，**不需因疫苗而調整或停用藥物**

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**，
包含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

我需要打疫苗嗎？

- 需要
- 巴金森氏症 (含典型與非典型)患者，若感染COVID-19，動作與非動作 **症狀** 皆會加重，**死亡風險** 也會增加

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- 可以
- 疫苗不會影響巴金森氏症的病程變化
- 疫苗 **不會干擾** 巴金森氏症 **藥物** 治療，施打當日不須減藥，也不須停藥
- 建議注射在 **動作較遲緩** (症狀較嚴重)側的手臂

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
包含：AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生

神經科(肌無力症&多發性硬化症)

謝函潔 神經科專科醫師

我需要打疫苗嗎？

- 兩者皆 **需要**！
- 肌無力患者若感染COVID-19，有較高的 **住院** 率與 **重症** 率

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**
- **肌無力症** 患者服用 美定隆(Mestinon/俗稱 **大力丸**)，不影響 疫苗接種
- 使用 **類固醇** 或其他 **免疫抑制劑** 患者，**不須** 停藥，但因可能影響疫苗產生 抗體之效力，應持續加強自我防護 (戴口罩/勤洗手/社交距離/避免群聚)
- 接受 **單株抗體** 治療者，請務必與醫師討論 **接種時間點**

我該選擇哪一種疫苗？

- 此 **兩種** 疾病皆屬 **神經免疫** 疾病，免疫功能系統 **失調**，**不建議** 接種 **活性減毒疫苗**
- 國際認可的 **腺病毒** 或 **mRNA** 疫苗 **都是適合的疫苗**
含：AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT/嬌生

我需要打疫苗嗎？

- 根據國際 **骨質疏鬆症** 基金會、歐美相關醫學會聯合指引，**建議施打**

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**，目前無證據顯示任何骨質疏鬆治療會干擾疫苗效果或增強副作用
- 接種 **時間點** 建議：
 - 保骼麗** (Prolia針劑) 或 **益穩挺** (Evenity針劑) → **間隔4~7天**
 - 骨力強** (Aclasta針劑) 或 **骨維壯** (Bonviva針劑) → **間隔7天**
 - 福善美** (Fosamax口服)、**瑞骨卓** (Reoteo口服)、**鈣穩** (Evista口服)、**骨穩** (Forteo針劑) → **不需停藥**

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**，
包含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

我需要打疫苗嗎？

- **建議施打**，因康復者體內抗體會逐漸減少，保護力下降，仍可能 **再次感染**
- 康復者(終止隔離)，建議自發病日起，至少 **六個月後** 再施打，避免影響疫苗效力
- 若於施打第一劑後感染，同樣應於發病日後間隔至少六個月，接種第二劑

我正接受復健治療可以打疫苗嗎？

- **可以**，一般復健治療並不影響疫苗本身作用
- 因可能影響 治療安排/儀器設定，若施打後有 **紅腫熱痛** 等不適， **務必告知醫師**
- 康復者雖已無病毒感染，但病程中可能造成的 **心肺/肌肉/大腦/神經系統** 等 **功能受損** (如Long COVID)，建議轉介至復健科接受 **復健治療**
- 目前專家 **不** 建議施打疫苗 **前** 預防性使用 **退燒止痛** 藥物(如普拿疼/布洛芬)
- **非 必要/治療需要** 使用的止痛退燒藥，施打前可先暫停，若有疑惑，請與 **醫師討論**

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
含：AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生

我需要打疫苗嗎？

- **需要**
- **慢性疼痛** 常難以忍受而嚴重影響生活品質，及早接種疫苗，減少就醫感染之擔憂
- **急性疼痛** 往往是身體發出之警訊，請勿因為接種疫苗而延遲就醫

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- 接受 **增生療法**，沒有影響
- **嗎啡類** 止痛藥，沒有影響
- 單次 **類固醇注射** (關節與硬脊膜/神經): 疫苗施打 **前後兩週** 請避免注射類固醇
- 長期使用類固醇控制疼痛之患者，請與疼痛專科醫師討論
- **消炎/止痛藥** (如NSAID/普拿疼): 若非必要，建議施打 **前24小時** 內減少使用，避免影響疫苗效力之生成

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
含：AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT/嬌生

我正在接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- 目前我國 **並未** 將 **避孕藥** 及各種 **荷爾蒙** 治療(調經/更年期等)列為疫苗之 **禁忌症**
- 避孕藥及荷爾蒙治療 **本身** 即有低度的血栓風險
- **AZ** 與 **嬌生** 兩種疫苗於臨床施打後也出現 **罕見** 的血栓副作用
- 研究後發現，兩種血栓 **形成機制不同**，且避孕藥/荷爾蒙使用者施打疫苗後，血栓 **發生率** 並 **沒有上升**，因此我國將原先列為 **AZ** 疫苗禁忌症的 避孕藥/荷爾蒙 **刪除**
- 根據 **我國** 與 **國際** 建議(美國CDC與ACOG)，接種疫苗 **前後**，**不須** 調整或 **中斷藥物**

我該選擇哪一種疫苗？

- 原則上無論 **懷孕/哺乳** /備孕/使用 **荷爾蒙/避孕藥**，**國際認可** 的疫苗 **皆可施打**
含：**AZ** / **莫德納Moderna** / **輝瑞BNT** / **嬌生**
- 若須 **選擇**，可先考慮 **mRNA** 類疫苗 (**莫得納** /**輝瑞**)，以減少施打 **AZ/嬌生** 發生罕見血栓的擔憂
- 目前孕婦為開放公費施打疫苗之對象

我需要打疫苗嗎？

- 依據目前研究與共識，無論 **懷孕中**、**哺乳中**、或 **準備懷孕**，皆 **建議施打**
- **懷孕** 若感染COVID-19易產生 **併發症** 與 **重症**，提高 **早產** 風險
- 雖資料 **有限**，**懷孕/哺乳/備孕** 期間接種疫苗，至今 **未** 顯示有安全上的顧慮 (持續的 **國際安全監測** 進行中)，更確實的臨床研究正開始 **進行中**
- 備孕中，或哺乳中，施打疫苗 **前後**，建議不須特別避孕，**不須停止或延後哺乳**

我一定要打疫苗嗎？

- 是否要施打疫苗是 **母親** 私人且須被尊重的決定，建議可權衡下列考量：
 1. 接觸到 **病毒 / 感染** COVID-19的 **風險** ？
 2. 感染後疾病對 **自己** 與 **胎兒** 的 **風險** ？
 3. 目前已知疫苗的 **優點** 與 **安全性** ？
 4. 疫苗的 **副作用** ？
 5. **有限** 但持續進行的安全評估？

我需要打疫苗嗎？

- **滿18歲**：視同成年人，建議施打
- **12~18歲**：目前僅 **輝瑞BNT** 疫苗，獲得美國食藥局FDA緊急授權(EUA)，准許施打於12歲以上之青少年，其他品牌疫苗尚不能施打於18歲以下之兒童青少年，未來我國若有輝瑞疫苗，**仍須台灣食藥署評估** 是否給予緊急授權
- **12歲以下**：目前國際上 **無** 獲准施打之疫苗，基於安全性，**不建議施打**

我不能打疫苗，該怎麼辦？

- 鼓勵孩童周遭，可接種疫苗之成年人，及早施打，以 **間接保護孩童**
- **高中職以下學校** 及 **幼稚園和托育機構** 所有工作人員，目前列為 **第七類** 優先接種對象，除了他們的不可取代性之外，對孩童的保護，也是考量之一

我沒打沒關係吧，反正感染也不嚴重？

- 目前報告，孩童感染新冠肺炎產生重症的機率的確較低
- 但逐漸有報告，有些孩童於感染後期會出現一種表現 **類似川崎症** 的 **小兒多系統發炎症候群**，因目前對COVID-19的長期瞭解仍不足，**避免感染** 仍是重要的

我需要打疫苗嗎？

- **強烈建議施打**，美國精神醫學會甚至希望 精神病友 能優先施打
- 精神疾病患者 **感染率** 與 **死亡率** 皆較 **高**

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- 目前研究顯示，精神科藥物與疫苗 **沒有衝突**
- 接種疫苗 **不需要停用藥物**

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**，
包含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

我需要打疫苗嗎？

- **高度建議施打**
- 物質使用/成癮患者，本身常有多重疾病，**感染** COVID-19與引發**重症**的風險高
- 社會文化因素產生的**標籤**及相對**弱勢**，也會影響後續的**檢驗/醫療**資源
- 國際學會建議物質使用疾患患者**優先**施打疫苗

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**
- 目前研究顯示各種**戒酒藥物**與疫苗都無交互作用
- **美沙酮**或其他**成癮治療藥物**，與疫苗都無交互作用，不需調整或中斷治療
- **避免自行中斷治療**，引發戒斷症候群，或增加物質使用風險

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗**都是適合的疫苗**
含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

老年精神科(失智症)

許碩恩 老年精神專科醫師
2021/07/08

我需要打疫苗嗎？

- **建議施打**
- 研究顯示，失智症患者感染COVID-19後，**住院率/死亡率**皆較高，**譫妄**發生率也較高
- 若居住於**長照機構**，無法避免與他人**群聚**，更**強烈**建議施打
- **歐洲阿茲海默症協會 / 台灣失智症協會**，皆呼籲失智症患者應**優先**儘早施打疫苗

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**
- 目前**無**醫學證據顯示，**抗失智用藥**與疫苗作用有衝突，不須因疫苗而調整用藥

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗**都是適合的疫苗**
含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT/嬌生**

若患者無法決定該怎麼辦？

- 在**家屬**與醫療單位協助下，儘量讓患者**理解**疫苗之益處及風險，再由患者**自行決定**
- 明確**拒絕**施打的患者，**不宜強行**施打
- 因病情無法表示意見之患者，由**法定醫療代理人**與醫師討論後，代為決定

我需要打疫苗嗎？

- **強烈建議施打**，也**強烈建議戒菸**
- 吸菸是COVID-19 **重症風險** 之一，吸菸產生的氣溶膠(懸浮微粒)，也可能 **擴大病毒傳播** 範圍(**電子菸** 也是同樣現象)

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**
- 無論使用任何藥物協助戒菸(**戒必適 尼古丁替代療法.....**)，都 **不需要停藥**

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**，
包含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生**

我需要打疫苗嗎？

- 接受 **安寧照護** 患者，屬於 **感染** 及 **重症** 高危險群， **建議施打**
- 下列 **兩種** 狀況，可經由討論後 **考慮不施打**：
 1. **病況** 不穩或極度 **衰弱**
 2. **預期之生命存活期** 較短(如小於疫苗施打後至抗體產生之時間)
- 討論方式建議以 **醫病共享** 決策方式：
以 **病人為中心**，討論包含 病人本身傾向的照護目標/家屬想法/疫苗風險與益處 等等

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- 正接受緩和性 **放射線** 治療患者，可於 **任何時間** 點接種
- 正接受 **緩和性化療/免疫療法/標靶治療** 患者，建議與 **醫師討論**
(請參考 **腫瘤科/血液腫瘤科**)
- 其餘疾病用藥及安寧緩和用藥，原則上不與疫苗衝突，但因多屬 **複雜用藥**，
種類繁多，建議與 **醫師討論**

我該選擇哪一種疫苗？

- 因疾病(如 **白血病**) 或 **化療** 導致免疫力低下，皆 **不建議** 接種 **活性減毒疫苗**
- 國際認可的 **腺病毒** 或 **mRNA** 疫苗 **都是適合的疫苗**
含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT/嬌生**

我需要打疫苗嗎？

- 建議施打
- 目前 無證據顯示，COVID-19疫苗會提高 視網膜血管阻塞 或 出血 之風險
- 白內障 手術前後均可接受疫苗施打
- 視網膜剝離 / 高度近視 / 青光眼 皆非疫苗之禁忌症

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- 可以
- 可持續使用青光眼藥物、各類眼藥水
- 眼內注射 藥物治療 不 影響疫苗之施打

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 都是適合的疫苗
含：AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT / 嬌生

我需要打疫苗嗎？

- **建議施打**
- 疫苗造成泌尿道相關副作用輕微且比例極低
- 泌尿道相關癌症(如 **攝護腺癌**)患者, 因須持續就醫與癌症本身, **感染** 及 **重症** 風險高

我正接受藥物治療可以打疫苗嗎？

- **可以**
- **攝護腺癌** 患者使用之 **荷爾蒙治療**, 並 **不** 影響疫苗之效力與副作用
若使用 **針劑** 劑型, 建議與疫苗 **間隔4~7日**, 避免短時間重複注射, 造成局部不適
- 標靶治療/免疫治療/放射治療, 皆可接種疫苗
- 化療患者, 建議與醫師討論 **接種時間點**
- **攝護腺肥大** 患者使用之藥物(如波斯卡), 不 影響疫苗接種
- 預定 **手術** 者, 仍建議施打疫苗。為避免疫苗之副作用(如發燒/疲倦)與手術後併發症混淆, 建議重大手術 **前後兩週**, **暫緩** 施打

我該選擇哪一種疫苗？

- 目前國際認可的疫苗 **都是適合的疫苗**
含：**AZ / 莫德納Moderna / 輝瑞BNT/嬌生**